

(六)婦人乾血勞力

白帶子變多。去肝腸淨。入血。病二年之內。一兩。二年內。二兩。以針線縫住。用無灰酒。煮數沸。食肉。瘀血即行。如心中慌亂者。食白煮豬肉一塊。即止。

(七)婦人慣墮胎丹方

懷孕將近三月。用老母雞湯。入紅壳黃米。煮粥。食之。胎自固。

又方以母雞煮湯。加魚肝油。食之。每月一次。亦保胎。

傷傷神方 (楊舒榮)

無論水燙火灼。致傷皮膚。而至潰爛。嫩紅疼痛。用鮮活螺

殼。小約多少。選存性研末。入

蝦石膏末。梅片少許。研

勻。用麻油調敷。不過三四次

。逐漸止痛。神效無比。

(按。此方試用多次。屢見効

驗。)

寒疝脹痛方 (楊舒榮)

寒疝為七疝之一。因寒邪深襲

至陰。厥陰失疏。氣化不行。

腎囊腫大。少腹脹痛。小便澀

閉。用生附子二錢。麝香一分

。獨活大蘇一。搗如泥。安

臍中。緊繫。移時小便自通。

眼痛痛。按。此方溫經逐寒

。較得藥效近且速。急效甚宜

。如水痛因於濕熱。勿可

輕試。方錄曲水潘氏家秘。)

(一)濁毒清和劑
濁毒清和。重症非一。或病於前。或病於後。有久閉而不開。有腫痛而赤爛。有積熱而內症昏朦。或乘虛而神風濕濕。有陰邪結星而為翳。有陽邪鬱毒而為痰。當因症而詳辨。毋偏泥而拘執。

狀見赤爛星障。此外症成也。有昏朦流淚。此內障成也。病由食積物之太過。懷藏太厚。誤投熱藥。且多甘膩。或病後之虛弱未復。恣食辛辣燥膩。竭視勞瞻。衣衣烘火。沖冒風沙。燥熱而然。

談談心狹病 (續)

(徐相任)

治法之有無把握亦在是。故辨證為國醫之特長。以其無可假借。全憑客觀也。含其自然見證不辨。而施以無謂之種種人為機械。幾何而不誤妄病也哉。大似吾國所謂閉心移眼之象。與心弛縱之必由漸而來者。恰相反。致大邪狹閉。由口鼻而入。直走心肺。則心移眼之治。當用芳香開洩。利氣活血。將侵入之敵。一戰而驅之境外。則真氣復其流通之常。緊張者自不

本報 徐元詒 律師事務所 為常年法律顧問

特聘 羅家衡 律師事務所 為常年法律顧問

事務所北京路三十二號
電話一〇八四一號
事務所北京路六十四號
電話中央八九四六號

種痘指南 (四)

(診魯陳)

「全國嬰孩生後十二個月內。無醫生憑據。證其已患天痘者。必須種痘。又因牛痘力薄。故凡公私學校。(除夜間星期校外)之學生。年滿十二歲。而無醫生憑據。證其近五年內患天痘。或已種痘有效者。必須種痘。此外海陸新軍入伍時。及往國外者。亦須種痘。若痘症流行時。則由該地方官出示。全城人民。必須復種。

初次種痘。七日至少發痘一類。即為有效。二次則祇現紅塊。或水泡。已為有效。種而無效。須在年內復種。

痘症乾後。即有免病之效。若未種者。與患痘者接近。立即種痘。尚能免其傳染也。

(五)種痘後之現象

初次種後二三日。頭面微紅高突。漸起水泡。至六七日。小兒必發寒熱。痘點漸起。至八九日而化厚漿。痘四周紅腫。甚則連及腋下。幼孩及體弱者。發熱更甚。神疲納少。至十日。或十二日。痘漸乾。未幾而落。其痕先紅後白。種痘始終。約經三星期。若過常態。而痘毒延及通體者。亦僅見也。二次或三次種痘。發症較輕。為時更短。

本報主筆 楊志一 醫師 診例

(甲)特號二元 隨到隨診
(乙)門診一元 貧病減半
(丙)出診四元 路途遙加
(丁)膏丸方四元 次日取件
(戊)急病隨請隨到

時間 門診 上午九時至下午五時
出診 隨時
診所 上海南京路三九四號
電話 三九四三六號
啟處號掛

幸福報

社儀署

第二一六期
(日八十月五年九十國民)
分二洋售份每
日路南霞路馬三海上址館
國內年五每三計時
代現外本元月一每元
九加外元零三出均
五倍郵郵一出一方
計律在張目新閱五

本報目錄
全年之婦子 (秦丙乙)
眼病研究 (姚夢石)
談談心狹病 (徐相任)
藥物研究 (李健頤)
婦人產產方 (楊舒榮)
婦人陰瘻或生濕瘡方 (楊舒榮)
婦人不孕方 (楊舒榮)
婦人產後血暈方 (楊舒榮)
婦人產後腹痛方 (楊舒榮)
婦人產後惡露不盡方 (楊舒榮)
婦人產後發熱方 (楊舒榮)
婦人產後咳嗽方 (楊舒榮)
婦人產後便秘方 (楊舒榮)
婦人產後泄瀉方 (楊舒榮)
婦人產後驚風方 (楊舒榮)
婦人產後抽搐方 (楊舒榮)
婦人產後昏迷方 (楊舒榮)
婦人產後死亡方 (楊舒榮)

經驗良方

婦人病驗方一束

(一)婦人慣半產。或三月或五月按期不移者。白朮一觔。去皮廬。置糯米上蒸半枝香。晒乾研末。人參八兩。焙爲末。雲茯苓二兩生研。桑寄生六兩(以自收者爲末。川杜仲炒去絲爲末。以大棗一觔雙鹽。以水熬汁。和九棗子大。曬乾退火氣密貯。早晚各服三錢。米湯送下。

(二)婦人陰癢或生濕瘡方

御魚切片。以稀軟布裹入陰戶

今年之痧子

樂丙乙

入春以來。痧子盛行。小兒之患者。迄於今會未稍替。其勢之盛。迥非往昔之比。其間險夷參半。危亡者時有所聞。此其原因。實由於今春天氣不正。寒緩失宜。疔癘之氣。隨風四播。小兒肺嬌嫩。時氣由口鼻吸入。逕犯肺胃。與肺胃之蘊熱合併。交相爲患。遂致通身赤赤。如果如米。隱隱紫紫於肌膚之間。所謂痧子是矣。當此之時。胸膈懊。莫名難過。而煩燥不安之狀。實非楮墨所足形容。其甚者痧子逐漸散見。光潤鮮明。三日後以次沒化。五六日而大已。則病勢順利。堪告慶慰。不幸而穢質素虧。或誤治遲延。則變症蜂起。惡象頓呈。或喉痛鼻衄。或汗出不止。或乍出即沒。絕無形影。或熱毒下陷。下利驚搐。蜀道崎嶇。挽回難望。更有飲食失節。起居不慎。釀成種種惡劣之環境。大概痧子一症。以小兒居多。固不可爲重。亦難以言輕。非開護得法。治療得宜。其禍之速。竟有出人意表者。誠大可畏矣。

(完)

常醫家
識藥庭

二四內本
門十分書

中傷咳痰瀉溫風
風寒嗽逆痢痛
黃脚暑厥喉寒瘧
疽氣痢眼吐痺
門門門門門門
癰白五虛三咳吐
厥瀉淋勞帶喘血
疝汗便瘕痰遺癰
氣病血閉成精狂
門門門門門門
口目耳微五咽
病病病病病病
門門門門門門
癰瘰癰癰痔牙
頰血尿淋補齒
門門門門門門
一。祇洋萬精册
外收一言印。畫
銀大元。用洋
寄洋。定共
費八特國十典一
角價大六紙兩

發報奉南路三
行館路雲馬海
售代局會界世海上

長篇小説
軍醫生活記

(余不平)

第三回 射河濱涕別知己友
火車沾簷卽外交家

大力士走到江邊，忙把大木頭担在江上。從木頭上走過江南。又把木頭扛了就走。追趕的人。趕到江邊。跳不過去。只氣得三屍神暴跳。急忙搬了一塊三百六十斤的大石頭。搬過江去。那知沒有鄉到大力士。却巧鄉在江南岸王齋子的粥棚內。王齋子還不知道。一口喝到嘴內。兩牙一嚼。不提防。把板牙碰掉一大塊。再把這大石頭吐出來看看。只氣得發誓拿第十一。跑回家去。把他女兒一頓惡打。說你為什麼煮粥不留心。把這樣大一個砂子都沒有淘掉。該打不該打。——這一段童話。同鏡花緣中大人國的了鎮江。再看有江干燈火。十里通紅。金焦之勝。隱然在望。江流激湍。泌我胸襟。精神爲之一快。隨即將行李運到孟淵旅社。住下不提。第二天早晨。連忙又趕到車站。打票上車。不到兩個鐘點。便又到了那龍盤虎距的南京城。剛剛到了火車。向站前行去。迎面來了一行人。是上火車的。前面一人。精神奕奕。年在四十左右。身著西裝。眼戴一付托力克。後面隨從數人。走過之後。旁邊有人說道。那便是外交家王正廷氏。我心中方才明白。今天又看見一個當代的大人物。出了車站。

(未完)

藥物研究

(李健頤)

淡竹葉與苦竹葉相比較

淡竹葉與苦竹葉。功用相侔。中國本草各書。皆有明言。考淡竹。係原野自生。春生細葉。節有白粉。質稠密。高約二三尺。葉間作箭簇形。色白綠。成疏疎之長穗。其根一葉數十叢。叢上結子似麥冬而堅。其葉能流涕下降。入心胃二經。兼行肌表熱氣。治上焦煩熱風邪。早有殊功。苦竹葉功比淡竹葉更強。蓋苦竹葉有經霜白露。含冰呶雪之質。故有辛寒散熱之力。如竹葉石膏湯之用苦竹葉者。乃假其辛寒以散陽明邪熱之意也。乃若銀翹散。則不宜用也。若誤用之。則有引邪入心之害。然銀翹散

洋瀉葉之功用

中國醫藥大辭典云：「洋黃葉，係大黃苗。有清腸熱瀉大黃之能。」余觀其黃葉之性質，與大黃不同。大黃功力宏著，多能除腸腑中積聚，胃內瘀垢，以及陽明實家之症。少用有補胃之功。仲景用大黃，謂承氣，即此之意也。化學實驗新本草一書，於大黃有微補之功。已詳論矣。鄙人研究黃葉之性質，及其功用，約有年餘。先由試用，以以後得於實驗者。蓋洋黃葉性質輕清，氣味淡薄，其能清涼發瀉，追逐腸中之水分，由大便以出。如有形食物積聚者，則彼不能為力也。且黃葉逐水之力愈大。如身體有缺乏水分者，最忌。因恐水分過瀉，即有生命之危。用者故宜慎之。平澤醫生嗜好黃葉，每用數兩之多，以收虛脫者。比比皆是。余親見之。觀前車之鑒，特錄于茲，以告于世。

幸福報
第三集
第四集
彙訂出版

本兩集由第一年幸福報全年材料裝訂而成每集共一百頁計三十萬言由全國數百位名醫選述內容所載完全切合實用無論內外婦幼花柳等症以及一切急救自療方法莫不應有盡有得此一書小病能自行治療大病免藥石亂投稱之爲「康健保障」誰曰不宜每集售大洋一元存書無多欲購從速

總發行所上海三馬路雲南路口幸福報館

眼病研究

姚夢石

煎湯洗拭乾。再用乳香、沒藥各錢半。枯礬六分。研末擦之。

(三)婦人小便不通方
杏仁七粒去皮尖。麝炒黃研末。水調三服。

(四)婦人前陰或後陰生蟲方
蜂蜜煉二兩。甘草研末三兩。和勻蜜患處。蟲自出。再以蛇床子朴硝各一兩煎湯洗。

(五)室女乾白痢方
豚本虫十數個。瓦焙存性爲末。每用五分。上好黃酒調服，不過十服而愈。

●痘疹害目說

痘疹害眼。多因胎毒。或前或後。積熱蘊深。或餘毒攻伐。自臚達外。致成星翳腫膜。宜分虛實。但以活血解毒而已。活血不致於熱。解毒不致於涼。俟腫後治之。雖有目翳。切不可用點藥。只宜活血解毒。俟五臟平和。翳當自去。若用點藥。則非徒無益。而反害之。即用丸散。須小劑調服。如眼無光。過百日後。血氣完復。則目自明矣。海藏云。斑疹後。風熱毒結成翳膜。虛時。以鴛青丸治之大致。初覺易治。又西江月調曰。痘疹餘毒害眼。壬癸丁酉逆爭。二火熾盛反制。生。五藏皆病可稱。

羚羊角散——痘疹害目毒未清。羚羊錦紋決玄明。升防成著車前子。細量輕重保嬰孩。

消毒化癰湯——未滿二十化癰湯。餘治相同羚羊方。升麻麻黃羌防主。柴葛本連芎地當。萸荳甘陳翹蘇木。花粉二朮細柏香。